~~n° 154~~ observations sur l'operation de la hernie inguinale
n.° 81.
par M. Letourneur.

tous les autheurs, qui, a ma connoissance, ont ecri sur les opérations de chirurgie, d'eident, en traitant de celles du bubonocelle et de la hernie complette, la necessité de l'opération, apres avoir mis en usage pendant un tems assez court tous les moyens de favoriser la réduction.
Sans vouloir rien diminuer du respect dont je suis pénetré pour ces grands maitres de l'art, n'y donner atteinte a cette doctrine, je crois qu'il est des ocasions ou l'on peut differer utilement l'opération; comme lorsque la tumeur est très dure, ou que les tegumens qui l'a recouvrent sont enflammés. ces deux symptomes sont fréquens et connus, j'en vais fournir deux exemples.

1.° un religieux recollet, qui depuis sa naissance portoit une hernie sans s'en être apperçu, à l'age de trente ans en prêchant à une lieue d'icy, fut saisi d'un étranglement et s'en revint a pied à sa maison; je ne le vi que le lendemain.
La tumeur qui descendoit iusqu'au bas du scrotum, au coté gauche, étoit dure comme un baton, avec constipaction et vomissement. les embrocations, les cataplasmes émolliens et résolutifs, les lavemens et les bains souvent reitérés et onze a douze saignées ramollirent la tumeur et luy donnerent du ressort; le malade vomit cependant toujours et même les matieres fecales pendant les trois derniers

ARC 15 d 77
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

jours. il consentit enfin à l'opération, d'ont il avoit été détourné par quelqu'un de l'art, et je l'a fis à la fin du sixieme jour.
je trouvai l'intestin très sain, il étoit seul dans la tumeur: mais apres avoir coupé l'aneau, je fus obligé de reporter deux fois mon bistouri pour dilater les aponévroses du transverse et de l'oblique interne.

j'aurois, je pense, trouvé encore de plus grandes difficultés si l'érétisme de ces différentes parties n'eut été relâché par l'usage des remedes indiqués continué long tems avec le plus grand soin. la playe fut cicatrisée en vingt cinq jours.
on refusa, contre mon avis de donner un bandage à ce malade, assurant que la cicatrice seroit un obstacle suffisant au retour de la hernie. ce religieux prêcha dans notre ville le jour de la chandeleur, cinq mois moins trois jours apres l'opération; la hernie reparut en chaire, j'en fis la réduction et luy remis le bandage spica en attendant qu'il eût un brayer, qu'il porta pendant un an. il y à douze ans qu'il l'a quitté sans aucune apparence de récidive, quoyqu'il ait continué l'exercice de la prédication.

2e. Trois ans environ apres cette opération je vi un paysan agé de vingt ans dans une hernie complette avec étranglement, aussi au côté gauche, et qui duroit

depuis vingt quatre heures. les parties étranglées ne descendoient que jusque au milieu du scrotum.

outre que la tumeur étoit a peu pres aussi dure que la précédente, elle étoit atteinte d'une inflammation érésipélateuse. le malade vomissoit tout ce qu'il prennoit, et c'étoit à la fin de juin par un tems fort chaud. la tumeur avoit été maniée par les mains dures et ineptes d'un vieu paysan.

je saignai le malade et laissai aupres de luy le chirurgien d'un village voisin, à qui je recommandai de le resaigner de trois en trois heures; les saignees furent continuées au nombre de dix; le vomissement cessa des la premiere. les lavemens et les bains furent répétés nombre de fois. on ne fit usage que du cataplasme de mie de pain renouvellé souvent, au quel on ajouta l'embrocation usitée a l'hotel dieu de paris des que l'inflammation commença à palir; elle cessa. la tumeur s'amollit, prit ressort, et au commencement du sept j'en fis l'opération. je trouvai dans le sac herniaire l'intestin, la hauteur de quatre travers de doigts du mésentére, et le testicule, les quels avoient une couleur aussi fraiche que s'il n'y eut point eu d'étranglement. des que j'eu dilaté l'aneau il sortit brusquement une bonne demi bouteille d'une liqueur claire comme eau de roche; cet incident m'inquieta beaucoup. j'avois négligé de sonder le malade,

ACADÉMIE N[illegible] DE MÉDECINE

parce qu'il avoit uriné depuis peu. la lympidité de cette
liqueur me tranquilisa cependant: mais je ne le fus en
entier que le lendemain a la levée de l'appareil, ou
j'appris que le malade avoit uriné comme à l'ordinaire.
Second embaras à la réduction de l'intestin. je me
souvins heureusement de l'expedient ingenieux de feu
le célébre monsieur petit en pareil cas, et il me réussit
comme à luy.

je fis la faute de ne pas ouvrir le scrotum jusqu'en
sa partie inférieure et je fus obligé d'y revenir dix
jours apres, malgré L'opposition du malade et de sa
famille, qui n'en avoient point fait à L'opération; ce
qui est, on ne peut plus, desagréable; quoyque l'entiere
cicatrisation n'en fût pas retardée.

L'es chirurgiens de province sont tres a plaindre d'être
isolés et sans conseil, surtout dans les petites villes
comme celles ou je suis fixé. on ne les excuse néantmoins
pas davantage.